Anhang 2: Standortpotenzial von Kartiereinheiten nach Umsetzungsschlüssel HpnV (VBS 1994/95), ergänzt

Kartiereinheit	Biotoptyp Schlußgesellschaft	Biotoptyp Ersatzgesellschaft
Hainsimsen-Buchenwald u.a.		
BA, BAh, Baw, BAl, BAi, BAih, BAiw, BAm, BAmh, BAmw	Laubwälder	Magere Wiesen, Borstgrasrasen
BAb, BAbh, BAbl, BAbw, BAbm, BAbmw, BAbmh	Laubwälder	Magere Wiesen, Wiesen und Weiden, (Borstgrasrasen)
BAbi, BAbih, BAbiw	Laubwälder	Magere Wiesen, Wiesen und Weiden
BAt	Trockenwälder	Borstgrasrasen, Trockenrasen
Perlgras- bzw. Waldmeister-Buchenwald		
BCa, BCah, BCal, BCaw, BCai, BCaih, BCaiw, BC, BCl, BCh, BCw, BCi, BCiw, BCm, BCmw, BCr, BCrw	Laubwälder	Magere Wiesen, Wiesen und Weiden
BCam, BCamw, BCrm	Laubwälder	Magere Wiesen, Wiesen und Weiden, Halbtrockenrasen
Waldgersten-Buchenwald u.a		
BD	Laubwälder	Magere Wiesen, (Halbtrockenrasen)
BDi	Laubwälder	Magere Wiesen, Wiesen und Weiden
BDl	Laubwälder	Magere Wiesen, Halbtrockenrasen
Seggen- bzw. Orchideen-Buchenwald		
BE	Trockenwälder	Halbtrockenrasen
Birken-Stieleichen- und Birken-Buchenwald		
EBi	Laubwälder	Nass- und Feuchtwiesen, Magere Wiesen, Borstgrasrasen
EBu	Bruch- und Sumpfwälder	Nass- und Feuchtwiesen, Borstgrasrasen
Buchen-Eichenwald und Eichen-Buchenwald		
EC	Laubwälder	Magere Wiesen, Borstgrasrasen
ECi	Laubwälder	Magere Wiesen, Nass- und Feuchtwiesen, Borstgrasrasen
ECu	Laubwälder	Nass- und Feuchtwiesen, borstgrasrasen, Moorheiden
Habichtskraut- Traubeneichenwald und - Felsgebüsch		
ED, EDd	Trockenwälder	Trockenrasen, Borstgrasrasen
Karpatenbirken-Ebereschenwald und Drahtschmielen-Bergahornwald		
EE	Gesteinshaldenwälder	Magere Wiesen, Wiesen und Weiden, (Borstgrasrasen)
Felsenahorn-Traubeneichenwald u.a. Traubeneichen-Felstrockenwälder		
EF	Trockenwälder	Halbtrockenrasen, Trockenrasen
Felsenbirnen- und Felsenkirschengebüsch		
EG	Trockenrasen	
Offener Fels und Gesteinshalde		
EH	Trockenrasen	
Waldfreies Zwischenmoor		
GA	Moore	
Waldfreies Niedermoor (Röhrichte...)		
GC		Röhrichte und Großseggenriede
Waldfreies Niedermoor (Wasserpfl...)		
GD	Tümpel	
Stieleichen-Hainbuchenwald		
HA	Laubwälder	Magere Wiesen, Wiesen und Weiden, (Nass- und Feuchtwiesen)
HAai, Hai	Laubwälder	Magere Wiesen, Nass- und Feuchtwiesen
HAau, HAu	Laubwälder	Nass- und Feuchtwiesen
Traubeneichen-Hainbuchenwald		
HCa	Trockenwälder	Magere Wiesen
HCat	Trockenwälder	Halbtrockenrasen
HCt	Trockenwälder	Halbtrockenrasen (Trockenrasen)
Bergulmen-Sommerlindenwald		
HE	Gesteinshaldenwälder	
Spitzahorn- und Eichen-Lindenwald		
HF	Gesteinshaldenwälder	Halbtrockenrasen
Bergahorn- und Eschenwald		
HG	Laubwälder	Magere Wiesen, Nass- und Feuchtwiesen
Bach und Bachuferwald		
SA	Bachuferwälder	Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichte und Großseggenriede
Quelle und Quellwald		
SB, SBa	Quellen, Bachuferwälder	Nass- und Feuchtwiesen
Erlen- und Eschensumpf		
SC, SCa, SCan, SCn	Bruch- und Sumpfwälder	Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichte und Großseggenriede, (Moore)
SCrn, SD, SDn	Bruch- und Sumpfwälder	Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichte und Großseggenriede
Schwarzerlenbruch		
SE	Bruch- und Sumpfwälder	Röhrichte und Großseggenriede, (Moore)

Kartiereinheit	Biotoptyp Schlußgesellschaft	Biotoptyp Ersatzgesellschaft
SEa	Bruch- und Sumpfwälder	Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichte und Großseggenriede
Birkenbruchwald und -moorwald		
SF, SFu	Bruch- und Sumpfwälder	Moore, Borstgrasrasen, Moorheiden
Hartholzaue der Flüsse		
SH	Hartholz-Flussauenwälder	Nasswiesen, Wiesen und Weiden, (Röhrichte und Großseggenriede)
Weichholzaue der Flüsse		
SI	Weichholz-Flussauenwälder	Röhrichte und Großseggenriede