# Planung vernetzter Biotopsysteme

## Aktualisierung der Zielekarten in den Landkreisen Neuwied und Ahrweiler

i.A. des
Landesamtes für Umwelt (LfU)

23.10.2020

FÖA
Landschaftsplanung GmbH

Auf der Redoute 12 • D-54296 Trier • Tel. +49 (0)651/910 48 0 • info@foea.de • www.foea.de

**Planung vernetzter Biotopsysteme – Aktualisierung der Zielekarten in den Landkreisen Neuwied und Ahrweiler**


Auftraggeber: Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Straße 7
55116 Mainz

Projektbetreuung: Dipl. Biol. Beate Bauer

Auftragnehmer: FÖA Landschaftsplanung GmbH
Auf der Redoute 12
54296 Trier
Tel.: +49 (0) 651 / 91048-0
info@foea.de
www.foea.de

Projektleitung: Dipl.- Umweltwiss. Kerstin Servatius

Bearbeitung: Dipl.- Umweltwiss. Kerstin Servatius
Dipl. - Ing. Dr. Jochen Lüttmann


Für die Richtigkeit:



(Dipl. - Ing. Dr. Jochen Lüttmann)

## Inhaltsverzeichnis

**1 Anlass und Zielsetzung ..... 5**

**2 Leitarten des Biotopverbunds für die Landkreise Neuwied und Ahrweiler ..... 6**

**3 Bestandskarten der Planung vernetzter Biotopsysteme ..... 8**

**3.1 Aufbereitung der Datengrundlagen ..... 8**

3.1.1 Biotopkataster Rheinland-Pfalz ..... 8

3.1.2 Forsteinrichtungsdaten ..... 9

3.1.3 ATKIS-Daten ..... 9

3.1.4 Gewässerdaten ..... 9

3.1.5 Höhlen, Stollen, Ruinen und andere Punktobjekte ..... 9

**3.2 Zusammenführen der Datengrundlagen ..... 10**

**3.3 Ergebnis Bestandskarte ..... 11**

**4 Zielekarten der Planung vernetzter Biotopsysteme ..... 12**

**4.1 Regelbasierte Zuweisung von Zielen (Ebene Biotoptypen) ..... 12**

**4.2 Leitartenorientierte Umsetzung der Zielgrößen der Planung ..... 16**

**4.3 Ergänzende Schritte der Zielableitung ..... 26**

4.3.1 Entwicklungsbereiche im Offenland – Komplexbiotope ..... 26

4.3.2 Besonderheiten der Landkreise Neuwied und Ahrweiler ..... 27

4.3.3 Integration externer Fachkonzepte ..... 27

4.3.4 Integration der Wildtierkorridore ..... 29

**4.4 Abschließende GIS-technische Bearbeitungsschritte zur Erstellung der Zielekarte ..... 30**

**4.5 Ergebnis Zielekarte ..... 30**

**5 Quellenverzeichnis ..... 31**

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Prioritäten / Regeln zur Verschneidung der Grunddatensätze ..... 10

Tabelle 2: Regelkatalog für die Zuweisung von Entwicklungs- bzw. Erhaltungszielen (entnommen den Textbänden der VBS 1993/94, ergänzt) ..... 12

Tabelle 3: Anwendungskriterien zur leitartenorientierten Umsetzung der Zielgrößen der Planung ..... 17

Tabelle 4: Liste ausgewerteter externer Fach-Konzepte ..... 28

**Kartenverzeichnis**

Karte 1: Zielekarten der Planung vernetzter Biotopsysteme im Landkreis Neuwied im Maßstab 1:25.000, Blatt 1-5

Karte 2: Zielekarten der Planung vernetzter Biotopsysteme im Landkreis Ahrweiler im Maßstab 1:25.000, Blatt 1-7

**Anlagen**

Anhang 1: Auswahl von Leitarten für die Landkreise Neuwied und Ahrweiler aus der Gesamtliste der Leitarten des Biotopverbunds (LUWG 2018)

Anhang 2: Standortpotenzial von Kartiereinheiten nach Umsetzungsschlüssel HpnV (VBS 1993/94), ergänzt

# 1 Anlass und Zielsetzung

Gegenstand der Beauftragung ist die Aktualisierung der Zielekarten der Planung Vernetzter Biotopsysteme (VBS) für den Landkreis Neuwied (NR) und den Landkreis Ahrweiler (AW) gemäß der Vorgaben der Arbeitshilfe VBS (FÖA 2015).

Der Landkreis Neuwied hat eine Exklave nahe der Grenze im Landkreis Westerwald. Aufgrund seiner Kleinflächigkeit wird der Bereich in den Zielekarten des Landkreises Westerwald mit dargestellt.

Die Aktualisierung erfolgte durch Zusammenstellung und Aufbereitung von Grunddatensätzen (Biotopkataster, Forsteinrichtung, Gewässerdaten, HpnV u.a.) zur Ableitung einer aktuellen Bestandskarte. Daraus wurden aktuelle Zielekarten durch Zuweisung von Zielen nach dem Umsetzungsschlüssel der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation (HpnV, LUWG 2009) und einer leitartenorientierten Umsetzung der Zielgrößen der Planung (gemäß der Zielvorgaben der Textbände der VBS NR 1993 und AW 1994), unter Berücksichtigung von Vernetzungsaspekten, abgeleitet.

Eine Aktualisierung der zugehörigen Textbände wurde nicht vorgenommen, da die zentralen textlichen Aussagen weiterhin Gültigkeit beanspruchen.

# 2 Leitarten des Biotopverbunds für die Landkreise Neuwied und Ahrweiler

Entsprechend den Empfehlungen aus BURKHARDT et al. (2004) soll sich die Planung an Leitarten orientieren. Leitarten sind Arten mit relativ engem Habitatbezug, welche zugleich über den Habitatbezug hinausgehende, besondere Raumqualitäten beanspruchen. Im Kontext der Verbundplanung sind v.a. Arten relevant, die einen hohen Raumanspruch (Flächenmindestgröße) und/oder Mindestanforderungen hinsichtlich des Biotopverbundes (Maximaldistanzen zwischen Biotopen) haben.
Zur Auswahl der Leitarten für die Landkreise Neuwied und Ahrweiler stand die Gesamtliste der Leitarten des Biotopverbunds (LUWG unveröff, Stand: 2018) zur Verfügung. Aus dieser Liste wurden zunächst solche Arten ausgewählt, für die ein Vorkommen nach Artdatenpool des LfU (im TK 25 Raster) im Landkreis bekannt ist.
Die Kohärenz des Netzes Natura 2000 zu fördern, ist ebenso eine Zielsetzung der VBS. Dementsprechend wurden von den Arten der Anhänge II und IV FFH-Richtlinie und den Vogelarten nach Anhang I Vogelschutzrichtlinie zusätzliche Arten als Leitarten ausgewählt, wenn sie in einem, die Landkreise betreffenden, FFH- bzw. Vogelschutzgebiet Erhaltungsziel sind und bereits bei der Bearbeitung 1993/94 als Leitarten aufgeführt wurden. Zur Ableitung der Leitarten der Bearbeitung 1993/94 konnte nur der Textband des Landkreises Ahrweiler herangezogen werden, da nur dieser eine Leitartentabelle enthält.

Die sich daraus ergebende Liste möglicher Leitarten ist in Anhang 1 dokumentiert.

Für die zu bearbeitenden Landkreise werden entsprechend der allgemein für die VBS entwickelten Methodik (BURKHARDT et al. 1995) und analog zum Vorgehen in der VBS 1993/94 auch solche Arten im Rahmen des Leitartenkonzeptes für die Planung einbezogen, für die artbezogen keine umfangreiche Datengrundlage vorliegt. Entsprechend der Methodik VBS (BURKHARDT et al. 1995) sind auch Streudaten für die planerische Entwicklung von Schwerpunkträumen und für die (planerische) Steuerung des Biotopgefüges und der Nutzungen verwendbar. Hierzu müssen die Leitarten dann zu Gruppen (z.B. Gruppe der Leitarten für naturschutzfachlich bedeutsame Wälder) zusammengefasst werden. Maßgeblich ist weiterhin das potenzielle Vorkommen entsprechend der Lebensraumansprüche der Arten (Habitatpotenzial).

Wenn sich aus der Abfrage der Vorkommen ergibt, dass eine Art im o.g. Sinn als Leitart der VBS für den Landkreis einzustufen ist, erfordert das Leitartenkonzept der VBS nicht zwingend, dass die Vorkommen der Leitarten auch flächendeckend bekannt sind. Auch das Datenalter der Leitarten-Vorkommen spielt für die Anwendung im Rahmen der Planung VBS eine untergeordnete Rolle. Ältere Daten geben für Analyse und (Ziele-) Planung grundsätzlich wichtige Hinweise auf Erhalts- oder Entwicklungsflächen, insbesondere wenn die Vorkommen der jeweiligen Art in einem konkreten Teilraum über einen längeren Zeitraum oder zumindest mehrfach (durchaus in unterschiedlicher kleinräumiger Verteilung) immer wieder z.B. in der landkreisbezogenen Literatur benannt werden und sofern Habitatpotenzial für die jeweilige Art / Artengruppe auch heute noch vorhanden ist. Allerdings: Je mehr Informationen über die Ver-

teilung einer Leitart vorliegen, umso präziser lässt sich der Bedarf für Erhalt und zur Entwicklung der Lebensräume der Art naturschutzfachlich insgesamt und bezogen auf bestimmte Teilräume begründen, bzw. quantitativ unterfüttern. Insofern trägt eine gute Datenbasis wesentlich zur Fundierung der VBS-Planung bei.

Für die vorliegende Bearbeitung standen der Artdatenpool des LfU, Artnachweise aus der Natura 2000 Bewirtschaftungsplanung sowie die Artnachweise der Naturschutzverwaltung aus dem LANIS-System zur Verfügung.

# 3 Bestandskarten der Planung vernetzter Biotopsysteme

Die Ableitung bzw. Aktualisierung der Zielekarten der Planung vernetzter Biotopsysteme basiert auf der Zusammenstellung einer aktuellen Bestandskarte, für die ein möglichst flächendeckender und aktueller Datenbestand erforderlich ist.
Eine flächendeckende Kartierung der Landschaftsstrukturen / Nutzungen, wie sie u. U. für vergleichsweise großmaßstäbliche Planungen, z.B. den Landschaftsplan, erarbeitet wird, ist nicht verfügbar. Aus diesem Grund ist die Zusammenstellung einer flächendeckenden Grundlage aus mehreren Eingangsdatensätzen mit unterschiedlichem Detaillierungsniveau erfolgt.

Die Flächenexklave des Landkreises Neuwied inmitten von Flächen des Landkreises Westerwald wurde nicht gesondert dargestellt (die innere Landkreisgrenze blieb unberücksichtigt).

## 3.1 Aufbereitung der Datengrundlagen

Im Folgenden werden die notwendigen Schritte zur Aufbereitung der vorhandenen Datengrundlagen für die Erstellung eines Bestandsdatensatzes dargestellt. Die Überführung der unterschiedlichen Biotoptypenklassen der Eingangsdaten in die VBS-Systematik richtet sich nach dem Schlüssel der Arbeitshilfe VBS (FÖA 2015).

Für die Landkreise Neuwied und Ahrweiler stehen folgende Datengrundlagen zur Erstellung des Bestandes zur Verfügung:

- Biotopkataster
- Biotoptypenkartierung Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr - Hocheifel
- Forsteinrichtung
- Satellitenbildauswertung zu Hauptbaumart / Entwicklungsphasen der Waldbestände
- ATKIS-DLM
- Gewässerkundliches Flächenverzeichnis

### 3.1.1 Biotopkataster Rheinland-Pfalz

Aus dem Biotopkataster wurden zur Erstellung der Bestandskarte die flächenhaften Datensätze der „substantiellen Biotoptypen“ (Datensatz BT) herangezogen. Der weiterhin verfügbare Datensatz der „schutzwürdigen Biotope“ (BK-Datensatz) wurde aus den im Leitfaden (FÖA 2015) dargestellten Gründen nicht in die Bestandserstellung einbezogen. Der Datensatz BT wurde vor der Weiterverarbeitung einer Topologieprüfung unterzogen. Inkonsistenzen (z. B: Überlappung von Flächen) wurden bereinigt.

### 3.1.2 Forsteinrichtungsdaten

Als wesentlicher Datensatz für die Bestandsaktualisierung (und Präzisierung gegenüber der VBS 1993/94) wurden die Daten der Forsteinrichtung (Datensatz Wald) herangezogen. Die Daten aus der Forsteinrichtung (FE) sind für die Bereiche von Staats- und Gemeindewäldern verfügbar (nicht für den Privatwald). Sie liegen in unterschiedlichen Aktualitätsstufen vor. Das Spektrum in den Landkreisen Neuwied und Ahrweiler reicht von 1990 bis 2017. Ca 44% der Daten stammen aus den letzten 7 Jahren, 40 % sind zwischen 2008 und 2013 und 16 % sind vor 2008 erfasst worden. Der Informationsgehalt der Forsteinrichtungsdaten im Vergleich zu den alternativ zur Verfügung stehenden ATKIS-Daten ist insgesamt so hoch, dass keine Abschichtung aufgrund des Datenalters erfolgt.
Zur Kompensation der in den Privatwaldflächen fehlenden Daten wurde außerdem eine Auswertung von Satellitenbildern mit Informationen zur Hauptbaumart und deren Entwicklungsphase[1] in die Erstellung der Zielekarten einbezogen.

### 3.1.3 ATKIS-Daten

Biotopkataster und Forsteinrichtung decken die von Vegetation geprägten Landschaftsbereiche nicht vollständig ab, weshalb für die verbleibende Landkreisfläche auf das Digitale Landschaftsmodell von ATKIS zurückgegriffen werden musste. Dazu wurde aus dem ATKIS-DLM „AX-Flaechen“ und „AX-Vegetation“ eine Synthese gebildet.
Um eine (scheinbare) Überplanung von Straßen in den Zielekarten zu vermeiden wurden die Mittellinien von Autobahnen und Bundesstraßen auf eine Breite von 10 m gepuffert und zusammen mit den Innenflächen von Auf- und Abfahrten als Verkehrsflächen den Siedlungsflächen zugeordnet. Der Datensatz liegt beim LfU für das ganze Land vor.

### 3.1.4 Gewässerdaten

Das Gewässernetz liegt in Form eines linienhaften Datensatzes der Wasserwirtschaftsverwaltung des LfU (gewässerkundliches Flächenverzeichnis) vor. Entgegen der früheren Handhabung (VBS 1993/94) wurde keine künstliche Verbreiterung der Gewässer auf pauschal 30 m vorgenommen (dies war der kartographischen Darstellbarkeit im Maßstab 1:25.000 geschuldet), sondern die Darstellung mittels eines Liniendatensatzes gewählt.

### 3.1.5 Höhlen, Stollen, Ruinen und andere Punktobjekte

Die Punktbiotope wurden aus den vorgehend beschriebenen Grundlagendaten zusammengeführt. Dabei wurden doppelte Einträge aus unterschiedlichen Datenquellen bereinigt.

Die flächenhaften Daten der Forsteinrichtung und des Biotopkatasters enthalten Hinweise auf Höhlen, Stollen, Ruinen und andere Objekte, die in den VBS-Karten punktförmig dargestellt werden. Um die Darstellung zu gewährleisten, wurde jeweils der Mittelpunkt der Flächen be-

[1] Aufbereitung von Fernerkundungsdaten durch Landesforsten RLP und Universität Trier – Umweltfernerkundung und Geoinformatik (Datenlieferung am 18.11.2019 durch Landesforsten RLP).

rechnet und zusammen mit bereits als Punktdaten vorliegenden Objekten aus Biotopkataster und ATKIS zu einem Bestandsdatensatz zusammengeführt. Trotz der resultierenden Lageungenauigkeiten sind die Angaben genau genug für den Planungsmaßstab VBS (1:25.000). Ergänzend zu den bereits beschriebenen Daten wurde zusätzlich der Artdatenpool des LfU auf Höhlen und Stollen mit Relevanz als Fledermauswinterquartiere überprüft und ggf. eingepflegt.

Die Darstellung der Punktbiotope in der Zielekarte macht keine Aussage über die Anzahl der Einzelobjekte: Aufgrund der teilweise hohen Dichte an Punktbiotopen wurden besonders nah beieinander liegende Biotope der gleichen Kategorie zu einem mittleren Punkt zusammengefasst, da diese sonst im Planungsmaßstab von 1:25.000 nicht zu unterscheiden wären.

## 3.2 Zusammenführen der Datengrundlagen

Zur Vermeidung unnötiger Kleingeometrien wurde bei der Verschneidung der einzelnen Grunddatensätze eine Verschneidungshierarchie angewendet, nach der nur solche Informationen in den Bestandsdatensatz eingebracht werden, die nicht bereits durch einen höherrangigen Datensatz abgedeckt werden.

**Tabelle 1: Prioritäten / Regeln zur Verschneidung der Grunddatensätze**

| | |
|---|---|
| Ebene 1a | **Biotoptypen (BT) und Biotoptypenkartierung NGP Obere Ahr Hocheifel**[2] ohne Waldbestände (Biotope wie Einzelbaum oder Kopfbaumgruppe sind für die Biotoptypen der VBS zu detailliert und werden nicht mit verschnitten). |
| Ebene 2a | **Forsteinrichtung**, wenn Attribut „BNA“ (=Bodennutzungsart) folgende Werte annimmt: Holzboden, Feldgehölz, Grünland, stehendes Gewässer, Sukzessionsfläche; Weihnachtsbaumkultur, Wiese, Ackerland.<br>Andere Attribute wie z.B. „Migration“ oder „Landespflegefläche“ lassen keine Ableitung des Bestands zu. |
| Ebene 2b | **Biotoptypen (BT) und Biotoptypenkartierung NGP Obere Ahr Hocheifel** Waldbestände (Die Waldbiotope aus dem Biotopkataster werden nach der Forsteinrichtung verschnitten. Hier wird von der Regel, dass nur Bereiche eingeschnitten werden, die im Ausgangsdatensatz nicht vorhanden sind, abgewichen, da die Informationen aus der Forsteinrichtung zum Waldalter und der detaillierte Biotoptyp des Biotopkatasters erwünscht sind). |
| Ebene 3 | **ATKIS** (Layer: Vegetation, flächenhafte Gewässer, Siedlung / Ortslage, Verkehr). |
| Ebene 4 | **Verkehrsflächen** (Puffer Autobahnen, Bundesstraßen) (aus Darstellungsgründen) |
| **Ferner**: | Naturwaldreservate, Waldrefugien etc. werden zunächst nicht verschnitten, Attribute werden auf Geometrien des Bestandsdatensatzes übertragen. |

Die bei der beschriebenen Vorgehensweise entstehenden Kleinstflächen sind auf ein Minimum reduziert. Die unvermeidbar entstandenen Flächen < 500 m² wurden mit den benachbarten Flächen verschmolzen, sofern es sich nicht um in der Systematik der VBS besonders zu berücksichtigende Sonderstandorte handelte.

[2] Flächen die in beiden Datensätzen mit unterschiedlicher Biotoptypenzuordnung vorliegen werden aus den Biotoptypen des Biotopkatasters RLP genommen, da diese Kartierung etwas jünger ist.

Für die Darstellung des Gewässernetzes wurde das gewässerkundliche Flächenverzeichnis des LfU ergänzt durch ggf. darüber hinaus vorhandene Gewässer aus dem Biotopkataster.

## 3.3 Ergebnis Bestandskarte

Im Ergebnis der zuvor erläuterten Arbeitsschritte zur Verschneidung der Eingangsdaten ergibt sich eine aktuelle Bestandskarte. Diese dient als Grundlage für die folgende Ableitung der Zielekarte.
Es erfolgt keine kartographische Darstellung des Bestandes. Den entsprechenden Datensatz erhält der Auftraggeber in Form eines Shapefiles.

In der Bestandskarte wurden alle aus den Eingangsdaten verfügbaren Informationen zusammengetragen, darunter auch kleinflächige Biotopstrukturen innerhalb von Ortslagen und der großräumigen Agrarlandschaften (Ackerraine, Straßenbegleitgrün, städtische Grünflächen u.a.), die in der späteren Zielebene nicht weitergeführt werden.

# 4 Zielekarten der Planung vernetzter Biotopsysteme

Neben dem aktuellen Bestand / der aktuellen Nutzung ist die Einschätzung des Biotoppotenzials der Flächen von Bedeutung. Dieses wurde aus der „Heutigen potentiellen natürlichen Vegetation“ (HpnV, LUWG 2009) abgeleitet. Die Zuordnung / Selektion von Flächen mit Habitatpotenzial richtet sich wie schon in der VBS 1993/94 nach der in BUSHART (1989) / WAHL (1990) dargestellten Methodik (vgl. Anhang 2). Die erforderliche Verschneidung mit dem Bestandsdatensatz folgt den in der Arbeitshilfe (FÖA 2015) dokumentierten Regeln.

Die Ableitung der aktualisierten Zielekarten der Planung vernetzter Biotopsysteme erfolgt in zwei Schritten:

- Zunächst wird eine regelbasierte Zuweisung von Planungszielen auf der Ebene der Biotoptypen nach den inhaltlichen Angaben der Textbände VBS 1993/94 durchgeführt.
- In einem zweiten Schritt erfolgt eine Spezifizierung anhand der Anforderungen der Leitarten hinsichtlich Flächengröße und Qualität ihrer Biotope. Weiterhin fließen hier die landkreisbezogenen Anforderungen des regionalen Biotopverbunds ein.

## 4.1 Regelbasierte Zuweisung von Zielen (Ebene Biotoptypen)

Die Zuweisung von Zielen auf der ersten Ebene – bezogen auf Erhalt und Entwicklung von Biotoptypen - erfolgt aufgrund folgender Regeln:

**Tabelle 2: Regelkatalog für die Zuweisung von Entwicklungs- bzw. Erhaltungszielen (entnommen den Textbänden der VBS 1993/94, ergänzt)**

| Reihenfolge | Kriterium | Zuweisung des Zielbiotops | Zuweisung des Ziels |
|---|---|---|---|
| 1 | Selektion aller Siedlungsflächen | Siedlung (71) | Biotoptypenverträgliche Nutzung (0) |
| 2 | Selektion aller Stillgewässer (Bestand) | Stillgewässer (15) | Erhalt (1), wenn sie im Bereich von Sonderstandorten liegen, ansonsten Entwicklung (2) |
| 3 | Selektion aller Flüsse, Flussauen, durchströmte Altwasser (Bestand) | Flüsse, Flussauen, durchströmte Altwasser (13) | Zielzuweisung ist einzelfallabhängig. Siehe Tabelle 3 |
| 4 | Selektion aller Bäche und Bachuferwälder, Gräben (Bestand) | Bäche und Bachuferwälder, Gräben (12) | Ziel richtet sich nach Gewässerstrukturgüte (GSG): GSG bis „mäßig verändert“ auf einer Strecke von mindestens 500 m: Erhalt (1), ansonsten Entwicklung (2) |
| 5 | Selektion aller Quellen und Quellbäche (Bestand) | Quellen und Quellbäche (11) | Entwicklung (2)<br>Begründung siehe Tabelle 3 |

| Reihenfolge | Kriterium | Zuweisung des Zielbiotops | Zuweisung des Ziels |
|---|---|---|---|
| 6 | Selektion aller weiteren Standorte für die bereits ein festes Ziel vergeben werden kann, da sie bereits aktuell (Bestand) erhaltungswürdig sind | Laubwälder (21)<br>Weichholz-Flussauenwälder (23)<br>Hartholz-Flussauenwälder (24)<br>Gesteinshaldenwälder (25)<br>Trockenwälder (26)<br>Bruch- und Sumpfwälder (27)<br>Magere Wiesen und Weiden mittlerer Standorte (32)<br>Nass- und Feuchtwiesen (einschl. Kleinseggenriede) (33)<br>Röhrichte und Großseggenriede (34)<br>Halbtrockenrasen und Weinbergsbrachen (36)<br>Trockenrasen, Felsen, Gesteinshalden, Trockengebüsche (37)<br>Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden (39) | Erhalt (1) |
| 7 | Selektion aller Potenzialflächen für Bruch- und Sumpfwälder, die an bestehende angrenzen<br><br>Bestand = übrige Wälder und Forsten, ggf. auch Strauchbestände | Bruch- und Sumpfwälder (27) | Entwicklung (2) |
| 8 | Selektion aller Potenzialflächen für Bruch- und Sumpfwälder<br><br>Bestand = übrige Wälder und Forsten, ggf. auch Strauchbestände<br><br>Größe der zusammenhängenden Potenzialfläche > 500m² | Bruch- und Sumpfwälder (27) | Entwicklung (2)<br><br>Für isolierte Entwicklungsflächen gilt eine Mindestgröße von 500m² (analog zu Biotopkataster RLP; Kartieranleitung, Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG: Mindestflächengröße) |
| 9 | Selektion der Potenzialflächen für Trockenrasen, die an bestehende angrenzen<br><br>Bestand = Wiesen und Weiden mittlerer Standorte, Pioniervegetation, Ackerflächen, Rebfluren, Obstplantagen<br>(sehr große Acker- / Wiesenflächen ausgenommen) | Trockenrasen, Felsen, Gesteinshalden, Trockengebüsche (37) | Entwicklung (2) |

| Reihenfolge | Kriterium | Zuweisung des Zielbiotops | Zuweisung des Ziels |
|---|---|---|---|
| 10 | Selektion der Potenzialflächen für Halbtrockenrasen, die an bestehende angrenzen<br><br>Bestand = Wiesen und Weiden mittlerer Standorte, Pioniervegetation, Ackerflächen, Rebfluren, Obstplantagen, Strauchbestände<br>(sehr große Acker- / Wiesenflächen ausgenommen) | Halbtrockenrasen und Weinbergsbrachen (36) | Entwicklung (2) |
| 11 | Selektion aller Potenzialflächen für Borstgrasrasen, die an bestehende angrenzen<br><br>Bestand = Wiesen und Weiden mittlerer Standorte, Pioniervegetation, Ackerflächen, Rebfluren, Obstplantagen, Strauchbestände<br>(sehr große Acker- / Wiesenflächen ausgenommen) | Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden (39) | Entwicklung (2) |
| 12 | Selektion aller Potenzialflächen für Gesteinshaldenwälder, die an bestehende angrenzen<br><br>Bestand = Übrige Wälder und Forsten, ggf. auch Strauchbestände | Gesteinshaldenwälder (25) | Entwicklung (2) |
| 13 | Selektion aller Potenzialflächen für Trockenwälder, die an bestehende angrenzen<br><br>Bestand = übrige Wälder und Forsten, ggf. auch Strauchbestände | Trockenwälder (26) | Entwicklung (2) |
| 14 | Selektion aller Potenzialflächen für Röhrichte, die an bestehende angrenzen<br><br>Bestand = Wiesen und Weiden mittlerer Standorte, Pioniervegetation, Ackerflächen, Rebfluren, Obstplantagen, Strauchbestände<br>(sehr große Acker- / Wiesenflächen ausgenommen) | Röhrichte und Großseggenriede (34) | Entwicklung (2) |

| Reihenfolge | Kriterium | Zuweisung des Zielbiotops | Zuweisung des Ziels |
|---|---|---|---|
| 15 | Selektion aller Potenzialflächen für Nasswiesen, die an bestehende angrenzen<br><br>Bestand = Wiesen und Weiden mittlerer Standorte, Pioniervegetation, Ackerflächen, Rebfluren, Obstplantagen, Strauchbestände<br>(sehr große Acker- / Wiesenflächen ausgenommen) | Nass- und Feuchtwiesen (einschl. Kleinseggenriede) (33) | Entwicklung (2) |
| 16 | Selektion aller Potenzialflächen für Magerwiesen, die an bestehende angrenzen<br><br>Bestand = Wiesen und Weiden mittlerer Standorte (in Regionen mit geringen Grünlandanteilen auch Pioniervegetation, Ackerflächen, Rebfluren, Obstplantagen, Strauchbestände)<br>(sehr große Acker- / Wiesenflächen ausgenommen) | Magere Wiesen und Weiden mittlerer Standorte (32) | Entwicklung (2) |
| 17 | Selektion der Potenzialflächen für Hartholzauenwälder die an bestehende angrenzen<br><br>Bestand = übrige Wälder und Forsten, ggf. auch Strauchbestände | Hartholz-Flussauenwälder (24) | Entwicklung (2) |
| 18 | Selektion der Potenzialflächen für Weichholzauenwälder die an bestehende angrenzen<br><br>Bestand = übrige Wälder und Forsten, ggf. auch Strauchbestände | Weichholz-Flussauenwälder (23) | Entwicklung (2) |
| 19 | Selektion der Flächen mit Hinweis auf Niederwald | | Aufsignatur Niederwald |
| 20 | Selektion der Flächen mit Hinweis auf Niederwald für die bisher noch kein Ziel-Biotoptyp vergeben wurde<br>NHK der Forsteinrichtung = „ertragsschwacher Wald“ | Laubwälder (21) | Erhalt (1)<br>(Aufsignatur bereits durch Regel 20 vergeben) |
| 21 | Selektion der Flächen mit Hinweis auf Niederwald für die bisher noch kein Ziel-Biotoptyp vergeben wurde<br>NHK der Forsteinrichtung = „Hochwald“ | Laubwälder (21) | Entwicklung (2)<br>(Aufsignatur bereits durch Regel 20 vergeben) |
| 22 | Selektion aller Flächen, die laut Forstdaten als Naturwaldreservat geführt werden | wie Bestand | Erhalt (mit Aufsignatur „Naturwaldreservat“) |

| Reihenfolge | Kriterium | Zuweisung des Zielbiotops | Zuweisung des Ziels |
|---|---|---|---|
| 23 | Selektion aller übrigen Waldflächen, die Buchen > 80 Jahre oder Eichen > 100 Jahre mit einem Mindestanteil von 10% (NR) bzw. 25% (AW) am Bestockungsgrad enthalten. (Siehe die Erläuterung im folgenden Text) | Laubwälder (21)<br>Bei hohen Anteilen von Kiefern: Laubwälder / Übrige Wälder und Forsten<br>Ggf. auch andere Waldbiotope je nach Potenzial | Entwicklung (2) |
| 24 | Selektion von Flächen mit hohem Anteil von Buchen und Eichen im Reifestadium (Satellitenbildauswertung) | Laubwälder (21) | Entwicklung (2) |
| 25 | Selektion von Flächen mit hohem Anteil von Kiefern im Reifestadium (Satellitenbildauswertung) | Komplex Trockenwälder / Übrige Wälder (26/22)<br>Komplex Laubwälder / Übrige Wälder (21/22) | Entwicklung (2) |

Regel 23 weicht von dem in der Arbeitshilfe VBS (FÖA 2015) vorgesehenen Mindestanteil von 5% am Bestockungsgrad ab. Dies resultiert aus einer zwischenzeitlich erfolgten (Nach-) Auswertung der Forsteinrichtung der bereits bearbeiteten Landkreise. Unter der Zielsetzung, in den waldgeprägten Gebieten des Landes, abseits der Sonderstandorte, eine vergleichbare Dichte naturschutzfachlich angestrebter Qualitäten in den Wäldern in der VBS darzustellen, wurde das Kriterium angepasst und der Mindestanteil wie in Tabelle 2 angegeben verwendet.

## 4.2 Leitartenorientierte Umsetzung der Zielgrößen der Planung

Anhand der o.g. Vorgehensweise konnte eine weitgehend regelbasierte Zuweisung von Zielen erfolgen (Zielekarte VBS). Die Erstellung der Zielekarte ist bis hierhin allerdings beschränkt auf die Ebene „Biotoptypen“.

Nach Vervollständigung der Bestandskarte schließt sich eine Überprüfung der Biotoptypen hinsichtlich ihrer Mindestgrößen nach Biotopsteckbrief (insbesondere unter dem Aspekt der Berücksichtigung der Ansprüche der Leitarten) und die daran orientierte Zuweisung weitergehender Ziele an. Basierend auf dem Leitartenkonzept wird die regelbasierte Zielekarte in dieser zweiten Bearbeitungsphase durch Flächenzuweisungen ergänzt, die auf fachgutachterlichen Einschätzungen/Bewertungen der vorhandenen Größe und des Verbunds von Biotopen (Ist) und der Notwendigkeit von Erweiterungen (Soll) beruhen. Das Soll ist in der Regel tierökologisch durch die Mindestflächenanforderungen der Leitarten an ihre Lebensräume begründet (s. in den Textbänden VBS 1993/94).

In Tabelle 3 sind die für diesen Arbeitsschritt maßgeblichen Zielgrößen und Anwendungskriterien zusammengestellt:

- die im Textband formulierten (planerischen) Zielgrößen der Planung in VBS 1993/94
- ggf. aus heutiger Sicht notwendige Abweichungen von der Vorgehensweise in VBS 1993/94
- Hinweise zur Umsetzung der Zielgrößen.

## Tabelle 3: Anwendungskriterien zur leitartenorientierten Umsetzung der Zielgrößen der Planung

| Zielgröße nach VBS[3] | Änderung gegenüber VBS 1993/94 | Umsetzung in Zielekarte |
|---|---|---|
| Quellen und Quellbäche | | |
| "Quellbereiche (Quellen und Quellbäche mit Quellwäldern, -sümpfen und -fluren sind in ihrer natürlichen Ausdehnung zu erhalten." (VBS 1993 NR, S. 30 & VBS 1994 AW, S. 38) | Darstellung erfolgt nicht mehr flächenhaft unter künstlicher Verbreiterung zur kartographischen Darstellbarkeit, sondern linienhaft. | Quellbäche werden aufgrund der Empfindlichkeit/ Schutzbedürftigkeit (auch der Leitarten) mit Entwicklungssignatur belegt. Eingeschlossen können jedoch auch Bereiche sein, die aufgrund ihrer Ausprägung lediglich erhaltungsbedürftig sind. Eine weitergehende Differenzierung ist datenbezogen nicht möglich. Umsetzung erfolgte bereits durch regelbasierte Ableitung. |
| Bäche und Bachuferwälder, Gräben | | |
| "Bäche und Bachsysteme müssen über mindestens 7 - 10 km eine hohe Gewässergüte (besser als II) und Strukturreichtum aufweisen sowie für Fische passierbar sein, um das biotoptypische Artenpotential halten zu können.<br>(AW: Ein unbewirtschafteter Uferstreifen mit Gehölzen und Sukzessionsgesellschaften ist insbesondere in landwirtschaftlich intensiv genutzten Bereichen zu entwickeln.)" (VBS 1993 NR, S. 35 & VBS 1994 AW, S. 44) | Darstellung erfolgt nicht mehr flächenhaft unter künstlicher Verbreiterung zur kartographischen Darstellbarkeit, sondern linienhaft.<br>Der Entwicklungsbedarf kann durch thematische Auswertung der von der Wasserwirtschaft bereit gestellten Daten (Strukturgütekartierung der Gewässer: GSG) für die mittleren und unteren Gewässerlauf-Abschnitte differenzierter dargestellt werden, als dies bei der VBS 1993/94 möglich war. | Naturnahe Bäche (mit einer Gewässerstrukturgüte (GSG) bis „mäßig verändert“ auf einer Strecke von – aus darstellungstechnischen Gründen - mindestens 500m) werden mit Erhaltsignatur gekennzeichnet, da diese den Ansprüchen der Leitarten entsprechen.<br>Anthropogen veränderte Bäche, die den Zielen der VBS nicht entsprechen, werden entsprechend mit Entwicklung belegt. Gewässerabschnitte, für die keine Information vorliegt, werden ebenfalls vorsorglich mit Entwicklung belegt.<br>Die Sicherung und Entwicklung der mit diesem Biotoptyp eng verzahnten Ufer- bzw. Pioniervegetation und entsprechender Strauchbestände entlang von bestehenden Gewässern wird kartographisch aus Maßstabsgründen nicht im Einzelnen dargestellt. Umsetzung erfolgte bereits durch regelbasierte Ableitung. |
| Flüsse, Flussauen und Altwasser | | |
| "Die Flüsse sind für wandernde Fischarten passierbar zu machen. 10 - 15 km lange, strukturreiche, unkompartimentierte Flussstrecken in enger Verzahnung mit flussbegleitenden Biotoptypen sind Voraussetzung zum Erhalt des biotoptypischen Artenpotenzials. Im Bereich solcher Flussabschnitte sind ökologisch intakte Auenbereiche (Auenwiesen, Auenwälder) zu entwickeln, wobei Auengrünlandkomplexe eine Kernfläche von minimal 10 ha Feuchtgrünland enthalten sollten. (AW: Barrieren zwischen Fluss und Nebenbächen in Form von Wehren, Sohlschwellen und Verrohrungen sind als Voraussetzung für eine duchgängige Wiederbesiedlung des Biotops Fluss durch die typische Fischfauna zu beseitigen.") (VBS 1993 NR, S. 43 & VBS 1994 AW, S. 52) | | Gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie[4] ist der ökologische Zustand des Rheins mäßig. Vor allem unter dem Aspekt der Schaffung von Durchgängigkeit wird eine Entwicklungssignatur verwendet. |

[3] Seitenzahlen nach Printausgabe; können von den Seitenzahlen im PDF abweichen

[4] http://www.wrrl.rlp.de.

| Zielgröße nach VBS[3] | Änderung gegenüber VBS 1993/94 | Umsetzung in Zielekarte |
|---|---|---|
| Stillgewässer | | |
| "Tümpel sollten eine Größe von ca. 100 - 500 m² aufweisen; kleinere Tümpel haben jedoch für viele Arten ebenfalls eine hohe Bedeutung. In der Regel dürften Entfernungen von ca. 200 m zwischen Tümpeln von vielen Tierarten zu überwinden sein.<br>In Abhängigkeit von Nutzung, Alter und Vegetationsstruktur bieten selbst kleine Weiher und Teiche einer Reihe von Tierarten Lebensraum. Bei Teilsiedlern, wie z.B. Amphibien, für die das Stillgewässer nur einen Teil des Gesamtlebensraumes darstellt, entscheidet die Lage (bzw. Erreichbarkeit) des Gewässers im Landlebensraum über die Besiedlung. Komplexe von etwa vier bis sechs, voneinander nur wenige hundert Meter entfernten Gewässern sind vorteilhaft; tragbar sind noch Entfernungen zwischen zwei bis drei Kilometern (BLAB, 1978)." (VBS 1993 NR, S. 48 & VBS 1994 AW, S. 57)<br><br>„Die im Planungsraum ausgeprägten Seen verschiedenster Größenklassen sind einschließlich großflächiger Verlandungs- bzw. Uferbereiche zu sichern." (VBS 1993 NR, S. 50 & VBS 1994 AW, S. 61) | Da die Unterscheidung von Seen und Tümpeln, Weihern und Teichen kaum anhand der Eingangsdaten vorgenommen werden kann und bereits für die VBS 1993/94 auf die Gebietskenntnis des Bearbeiters zurückzuführen war, wird eine Zusammenfassung beider Biotoptypen zur Klasse "Stillgewässer" vorgenommen. | Stillgewässer werden bestandsorientiert dargestellt. Eine Entwicklung im Sinne einer Neuschaffung von Laichgewässern wird nur dann dargestellt, wenn dies z.B. durch die Bewirtschaftungsplanung von Natura 2000-Gebieten explizit vorgesehen ist.<br><br>Bestehende Stillgewässer werden mit Erhalt gekennzeichnet, wenn sie im Bereich von Sonderstandorten liegen (z.B. Bruchwald, Feucht- und Nasswiesen etc.). Eine Ausweitung in die Sonderstandorte hinein ist nicht zielkonform.<br>Stillgewässer im Bereich von mittleren Standorten (Wiesen und Weiden, übrige Wäldern etc.) werden mit Entwicklung gekennzeichnet. Im Randbereich sollten ihre feuchten Kontaktbiotope (Röhrichte, Nasswiesen etc.) entwickelt werden, um als Puffer gegenüber den intensiv genutzten Standorten zu wirken. Auf diese Weise wird dem erhöhten Schutzbedürfnis gegenüber Immissionen aus dem Umfeld entsprochen. |
| Laubwälder | | |
| "Anzustreben ist die Ausweisung von Waldflächen von minimal 100 ha Größe und der "Vorrangnutzung Naturschutz" im Komplex mit möglichst großflächig naturnah bewirtschafteten Waldbeständen. In Wäldern mit höheren Altholzanteilen sollten, ausgehend von einem Schwarzspechtrevier bei einer mittleren Größe von ca. 400 ha, ca. sechs Altholzinseln mit einer Größe von mindestens 2 - 3 ha in ihrer Nutzung den Ansprüchen dieser Vogelart angepasst werden. (AW: Längerfristig ist diese Konzentration im Rahmen einer anzustrebenden ökologischen Waldentwicklung mit höheren Altholzanteilen zu modifizieren und zu ergänzen.)<br>(NR: In Bereichen, in denen das Haselhuhn vorkommt, sollte der Abstand zwischen zwei Waldbiotopen mit „Vorrangnutzung Naturschutz" maximal 1 km betragen).<br>Für wenig mobile Wirbellose (s. Wachtelweizen-Scheckenfalter) müssen Waldkomplexe erhalten/geschaffen werden, in denen die Entfernungen zwischen lichten Waldbeständen oder Waldmänteln und den angrenzenden Magergrünlandflächen (Waldwiesen etc.) nicht mehr als 500 m betragen." (VBS 1993 NR, S. 99 & VBS 1994 AW, S. 129) | | Aus der regelbasierten Zuweisung von Zielen resultiert i.d.R. bereits eine großflächige Darstellung des Biotoptyps Laubwälder mittlerer Standorte.<br>In Bereichen wo dies nicht zutrifft und zugleich eine Häufung von Artnachweisen auftritt, werden zusätzlich Entwicklungsflächen zwecks Sicherstellung von ausreichendem Biotoppotenzial für die Arten dargestellt.<br><br>Aktuell sind keine Vorkommen des Haselhuhns in RLP bekannt. Entwicklungspotenziale aufgrund grundsätzlich geeigneter Habitatstrukturen (Niederwaldartiger Charakter) wurden entsprechend den fachlichen Analysen des LfU als Haselhuhnpotenzialflächen berücksichtigt. |

| Zielgröße nach VBS[3] | Änderung gegenüber VBS 1993/94 | Umsetzung in Zielekarte |
|---|---|---|
| Gesteinshaldenwälder | | |
| "Gesteinshaldenwälder sind in ihrer standortbedingten Ausdehnung zu erhalten. Sie sollten in Biotopkomplexen (AW: mit Trockenwäldern) und Wäldern mittlerer Standorte eingebunden und möglichst über Bachtäler miteinander vernetzt werden." (VBS 1993 NR, S. 92 & VBS 1994 AW, S. 121) | | An bestehende Gesteinshaldenwälder (Erhalt) angrenzende Potenzialflächen nach HpnV werden mit Entwicklungssignatur belegt. Umgebende Flächen aus übrigen Wäldern sollen als Umgebungsschutz für die naturschutzfachlich bedeutsamen Gesteinshaldenwälder bevorzugt in (naturnahe) Laubwälder mittlerer Standorte / Trockenwälder entwickelt werden. |
| Trockenwälder | | |
| "Buschwaldgesellschaften sollten eine Mindestflächengröße von ca. 1 ha haben und möglichst weniger als 500 m voneinander entfernt liegen. Kleinere Trockenwaldbestände sind in Biotopkomplexe aus Magerrasen, Halbtrockenrasen und Trockengebüschen von 60 ha Größe einzubinden. (Trockene) Eichenwälder und das Galio-Carpinetum sollten ca. 50 ha groß ausgeprägt sein (AW: und möglichst in einem kleineren Abstand als 5 km zueinander liegen.)“<br>(AW: "In Bereichen, in denen das Haselhuhn vorkommt, sollten geeignete Waldflächen mindestens 100 ha Größe haben. Dabei sollte der Abstand zwischen zwei Waldbiotopen 1 km nicht überschreiten.")<br>(VBS 1993 NR, S. 90 & VBS 1994 AW, S. 118) | | An bestehende Trockenwälder (Erhalt) angrenzende Potenzialflächen nach HpnV werden mit Entwicklungssignatur belegt. Im Bereich konzentrierter Leitartennachweise werden auch weiter entfernt liegende Flächen zur Erlangung der angegebenen Mindestflächengröße mit Entwicklungssignatur gekennzeichnet.<br>Die für das Haselhuhn geforderten 100 ha geeignete Waldfläche können neben den Trockenwäldern auch durch das Vorhandensein von strukturähnlichen Niederwäldern erreicht werden. |
| Weichholz-Flussauenwälder | | |
| "Weichholz-Flussauenwälder sollten eine Mindestfläche von 20 Hektar nicht unterschreiten. Wegen der besonders engen Beziehung zum Hartholz-Flussauenwald sollten Biotopkomplexe beider Wälder angestrebt werden."<br>(AW: "Doch haben auch nur schmal ausgebildete Weichholz-Flussauenwälder eine hohe ökologische Bedeutung.")<br>(VBS 1993 NR, S. 102 & VBS 1994 AW, S. 133) | | Bestehende Flächen werden um angrenzende Bereiche mit Standortpotenzial erweitert.<br>Im Umfeld liegende Potenzialflächen für Laubwälder werden in Bereichen mit vielen Leitartennachweisen zur Schaffung von Komplexen mit 200 ha Größe genutzt. |
| Hartholz-Flussauenwälder | | |
| "Komplexe aus Hartholz-Flussauenwäldern, die mit Weichholz-Flussauenwäldern vernetzt sind, und offenen, xerothermen Bereichen sollten größer als 5 ha sein." (VBS 1993 NR, S. 104 & VBS 1994 AW, S. 136) | | Bestehende Flächen werden um angrenzende Bereiche mit Standortpotenzial erweitert.<br>Im Umfeld liegende Potenzialflächen für Laubwälder werden in Bereichen mit vielen Artnachweisen zur Schaffung von Komplexen mit 200 ha Größe genutzt. |

| Zielgröße nach VBS[3] | Änderung gegenüber VBS 1993/94 | Umsetzung in Zielekarte |
|---|---|---|
| Bruch- und Sumpfwälder | | |
| "Bruch- und Sumpfwälder sind entsprechend des Flächenangebotes des realen bzw. des potenziellen Bestandes zu sichern und zu entwickeln." (VBS 1993 NR, S. 106 & VBS 1994 AW, S. 139) | | Das Potenzial nach HpnV für Bruch- und Sumpfwälder wird ausgeschöpft (Mindestgröße für isolierte Entwicklungsflächen = 500m²; analog zu Biotopkataster RLP; Kartieranleitung, Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG: Mindestflächengröße).<br>Entwicklungsflächen werden vorrangig Flächen, die aktuell keinen Sonderstandort ausmachen (übrige Wälder und Forsten, Strauchbestände, etc.). Für Potenzialflächen, die aktuell dem Offenland zuzurechnen sind, wurde geprüft, ob z.B. eine Entwicklung von Röhrichtbeständen vorzuziehen ist. |
| Magere Wiesen und Weiden mittlerer Standorte | | |
| "NR: Magere Wiesen und Weiden mittlerer Standorte sollten eine Mindestfläche von 5 ha haben. Anzustreben sind Offenlandbiotopkomplexe mit anderen Extensiv-Grünlandbiotoptypen feuchter und sehr magerer Standorte (z. B. Nass- und Feuchtwiesen, Borstgrasrasen) von mehr als 25 ha Größe.<br>AW: Magere Wiesen und Weiden mittlerer Standorte sind als obligatorische Ergänzungsbiotope im Umfeld anderer Sonderstandorte (Halbtrockenrasen, Borstgrasrasen, Zwergstrauchheiden) in jeder Flächengröße zu sichern. Für den Erhalt von Populationen typischer Arten sind großflächige, i.d.R. nicht unter 10 - 20 ha Fläche umfassende Biotope im Komplex mit anderen Extensivgrünlandbiotoptypen magerer Standorte (z.B. Nass- und Feuchtwiesen, Borstgrasrasen) anzustreben.<br>Eine Entfernung zwischen zwei Biotopen der mageren Wiesen und Weiden sollte 500 -1000 m nicht überschreiten." (VBS 1993 NR, S. 68 & VBS 1994 AW, S. 85) | Entgegen der Darstellung in verschiedenen Bänden der VBS werden keine Mischsignaturen aus mageren Wiesen und Weiden und Ackerbiotopen verwendet. Stattdessen wird im Fall von Vorkommen entsprechender Leitarten (z.B. Wiesenvögel mit hohen Raumansprüchen etc.) die Signatur "Extensivierung intensiv genutzter Flächen, Erhöhung des Grünlandanteils" vorgesehen. | Übergeordnete Zielsetzung ist, dass Mosaike aus Grünlandbiotoptypen von mehr als 10 – 20 ha Größe entstehen bzw. verbleiben.<br>An bestehende Magerwiesen (Erhalt) angrenzende Flächen mit Standortpotenzial nach HpnV werden zur Erweiterung (Entwicklung) der Flächen genutzt, wo eine Konzentration der Leitarten (Leitarten der Streuobstwiesen werden mit einbezogen) vorliegt oder ein Defizitbereich (angegebene Mindestgrößen werden nicht erreicht) erkennbar ist. Hier werden Entwicklungsflächen schwerpunktmäßig aus den Wiesen und Weiden mittlerer Standorte abgeleitet. |
| Streuobstwiesen | | |
| "Streuobstwiesenbestände im Planungsraum sollten Flächengrößen von 50 ha möglichst nicht unterschreiten bzw. auf diese Flächengröße durch Nachpflanzungen ergänzt werden. (AW: Kleinere Bestände sind zu erhalten und in extensiv genutzte Grünlandflächen einzubinden.)" (VBS 1993 NR, S. 114 & VBS 1994 AW, S. 148) | | In Bereichen mit Nachweisen der anspruchsvollsten Arten der Streuobstwiesen (z.B. Wendehals) wird die Zielgröße 50 ha (für Komplexe mit Streuobstwiesen), auch durch Ausweisung von Entwicklungsflächen für Streuobstwiesen (Zusatzsignatur), angestrebt. |

| Zielgröße nach VBS[3] | Änderung gegenüber VBS 1993/94 | Umsetzung in Zielekarte |
|---|---|---|
| Wiesen und Weiden mittlerer Standorte | | |
| NR: "Aufgrund der Habitatansprüche typischer Arten sollten Wiesen und Weiden mittlerer Standorte in Biotopkomplexe mit anderen Grünlandbiotoptypen feuchter und magerer Standorte (Nass- und Feuchtwiesen, magere Wiesen mittlerer Standorte) von mehr als 20 - 30 ha Größe eingebunden sein." (VBS 1993 NR, S. 72)<br>AW: "Aufgrund der Habitatansprüche typischer Arten können Wiesen und Weiden mittlerer Standorte in Biotopkomplexen mit anderen Grünlandbiotoptypen feuchter und magerer Standorte (Nass- und Feuchtwiesen, magere Wiesen mittlerer Standorte) wichtige Ergänzungsbiotope darstellen und sollten in Grünlandbiotopkomplexe von mehr als 20 - 30 ha Größe eingebunden sein." (VBS 1994 AW, S. 88) | | Wiesen und Weiden werden als Ergänzungsbiotope in Komplexen mit anderen Grünlandbiotopen gesehen. Die formulierten Ziele werden im Rahmen der Zielableitung der anderen Biotoptypen bereits berücksichtigt. |
| Nass- und Feuchtwiesen (einschl. Kleinseggenriede) | | |
| "Aufgrund der Flächenansprüche typischer Arten sollte der Biotoptyp "Nass- und Feuchtwiesen, Kleinseggenriede" eine Mindestfläche von 5 ha haben und eine Entfernung zwischen zwei Biotopen sollte 500 m nicht überschreiten.<br>Anzustreben sind Offenlandbiotopkomplexe mit anderen Grünlandbiotoptypen magerer und feuchter Standorte (magere Wiesen und Weiden mittlerer Standorte, Borstgrasrasen, Großseggenriede) von mehr als 20 - 30 ha Größe." (VBS 1993 NR, S. 59 & VBS 1994 AW, S. 71) | | Bestandsflächen werden als solche gekennzeichnet (Erhalt) und v.a. in den Bereichen mit Schwerpunktvorkommen bzw. im Bereich der FFH-Gebiete, in denen sie Erhaltungsziele sind, erweitert (Entwicklung) mit dem Ziel, die Flächenansprüche der diesbezüglich anspruchsvollsten Arten zu befriedigen.<br>Dazu werden an bestehende Flächen direkt angrenzende, aufgrund ihres Standortes nach HpnV geeignete Flächen, zur Erweiterung genutzt.<br>In Bereichen konzentrierter Leitartennachweise werden auch nicht unmittelbar angrenzende Flächen genutzt, um ausreichend große Flächenkomplexe zu bilden. Entwicklungsflächen werden nur solche Flächen, die aktuell keinen Sonderstandort ausmachen (Wiesen und Weiden mittlerer Standorte, Strauchbestände, Pioniervegetation etc.).<br>Aufgrund der geringen Anzahl der Leitartennachweise wurde besonders die Vernetzung bestehender Ausprägungen gefördert. |

| Zielgröße nach VBS[3] | Änderung gegenüber VBS 1993/94 | Umsetzung in Zielekarte |
|---|---|---|
| Röhrichte und Großseggenriede | | |
| "Aufgrund der hohen Bedeutung selbst kleiner Schilfbestände sind Flächen von wenigen Quadratmetern Größe im Rahmen des Biotopsystems zu erhalten. Von hoher funktionaler Bedeutung sind alle Röhrichte und Großseggenriede ab einer Flächengröße von 0,5 ha.<br>(AW: Wie das Beispiel des Teichrohrsängers zeigt, sind auch linear ausgebildete Schilfsäume als Lebensraum und Vernetzungselement von hoher funktionaler Bedeutung in vernetzten Biotopsystemen.)" (VBS 1993 NR, S. 63 & VBS 1994 AW, S. 76) | | Bestehende Röhrichtflächen (Erhalt) werden anhand evtl. angrenzender Bereiche mit Standortpotenzial nach HpnV erweitert (Entwicklung). Dadurch wird der Zielsetzung entsprochen, die von den Leitarten geforderte Flächengröße (>= 0,5 ha) zu sichern / herzustellen.<br>Diese Sicherung von Mindestflächen erfolgt unabhängig davon, ob Leitarten aktuell nachgewiesen sind. Die Entwicklung erfolgt zu Lasten von mittleren Standorten (z.B. Wiesen und Weiden mittlerer Standorte). Bestehende andere Sonderstandorte müssen eigenständig bestehen bleiben, da gerade die Mosaike ihren naturschutzfachlichen Wert ausmachen.<br>In Bereichen mit Nachweisen der Leitarten werden nach den Möglichkeiten des Standortpotenzials weitere im Umfeld liegende Flächen als Entwicklungsbereiche mit Mindestgröße von 0,5 ha planerisch ausgewiesen. |
| Moorheiden | | |
| "Restbestände sind zu regenerieren und in Komplexe anderer, sehr magerer Offenlandbiotope, wie Borstgrasrasen, einzubinden. Flächen solcher Biotopkomplexe sollten möglichst 3 ha nicht unterschreiten." (VBS 1993 NR, S. 87 & VBS 1994 AW, S. 113) | | Aufgrund der hohen potenziellen naturschutzfachlichen Bedeutung einerseits und häufig vorliegenden Degenerationsstadien andererseits, werden die bestehenden Flächen als Entwicklungsflächen gekennzeichnet. Soweit Potenzialflächen für magere Offenlandbiotope angrenzen, werden diese gemeinsam als Entwicklungsflächen gekennzeichnet. Eine Erweiterung der Flächen zu Lasten umgebender Wälder bzw. Bruchwälder wird nicht angestrebt.<br>Spezielle artbezogene Anforderungen bezüglich Flächengröße oder qualität sind landkreisbezogen nicht umsetzbar. |

| Zielgröße nach VBS[3] | Änderung gegenüber VBS 1993/94 | Umsetzung in Zielekarte |
|---|---|---|
| Halbtrockenrasen und Weinbergsbrachen | | |
| "Aufgrund der Flächenansprüche typischer Arten sollten Halbtrockenrasen und Weinbergsbrachen eine Mindestfläche von 5 ha haben. In den Trockengebieten sind Biotopkomplexe mit Trockenrasen, Magerwiesen, Zwergstrauchheiden und Trockengebüschen von ca. 60 ha Größe anzustreben. Eine Entfernung zwischen zwei Biotopen des gleichen Typs sollte 100 - 500 m nicht überschreiten." (VBS 1993 NR, S. 76)<br><br>"Aufgrund der Flächenansprüche typischer Arten sollten Halbtrockenrasen und Weinbergsbrachen eine Mindestfläche von 5 ha haben. In den Kalkmulden und im Bereich der Keuperscharren sind großflächige, linear miteinander vernetzte Biotopkomplexe mit Trockenrasen, Magerwiesen, Trockengebüschen und lichten Kiefernwäldern anzustreben. Eine Entfernung zwischen zwei Biotopen des gleichen Typs sollte 100 - 500 m möglichst nicht überschreiten." (VBS 1994 AW, S. 95) | | Bestehende Halbtrockenrasen (Erhalt) werden durch angrenzend bestehende Flächen mit Standortpotenzial nach HpnV entwickelt. Wenn eine Vergrößerung aufgrund fehlenden Standortpotenzials nicht möglich ist, wird die Entwicklung von Komplexen mit mageren Wiesen und Weiden in der entsprechenden Größe vorgesehen. |
| Trockenrasen, Felsen, Gesteinshalden, Trockengebüsche | | |
| "Gehölzarme Trockenbiotope sind an ihren natürlichen Standorten unabhängig von ihrer Flächenausdehnung zu erhalten.<br>Aus vegetationskundlicher Sicht sind bereits Flächen von wenigen Quadratmetern von hoher Naturschutzbedeutung. Aus faunistischer Sicht sollten (NR: Teil-)Flächen dieses Biotoptyps mindestens 1 ha groß sein. Zum Erhalt des Arteninventars dieses Biotopkomplexes sind Flächenmosaike aus den o.g. Biotoptypen von 50 bis 60 ha Größe notwendig." (VBS 1993 NR, S. 80 & VBS 1994 AW, S. 104) | | An bestehende Trockenrasen angrenzende Potenzialflächen nach HpnV werden zur Erweiterung genutzt, wenn diese nach aktuellem Stand als Offenlandbiotope eingestuft werden und keine Sonderstandorte ausgebildet sind.<br>Wo dies aufgrund der naturschutzfachlich sehr bedeutsamen Leitartenvorkommen vordringlich erscheint, sollte verstärkt das zweite Ziel, die Bildung von Flächenmosaiken von 50-60 ha Größe verfolgt werden. Zu den Mosaiken zählen Biotope, zu denen Vernetzungsbeziehungen besonders funktionaler Bedeutung bestehen: Halbtrockenrasen, Trockenwälder, Waldsäume, reichstrukturierte, blütenreiche, offenlandbestimmte Biotope ( magere Wiesen und Weiden, Borstgrasrasen).<br>Als Höchstdistanz zwischen Einzelflächen für die Ermittlung der 50-60 ha Flächenmosaike werden 500 m verwendet. Für Laufkäfer von Trockenbiotopen beschreiben DE VRIES et al. (1996: Seite 339) dies als eine "kritische" Entfernung zwischen Lebensrauminseln, die nicht mehr überwunden wird. |

| Zielgröße nach VBS[3] | Änderung gegenüber VBS 1993/94 | Umsetzung in Zielekarte |
|---|---|---|
| Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden | | |
| "… Borstgrasrasen sind heute meist kleinflächig und isoliert gelegen. Borstgrasrasen sind im Umfeld bestehender Ausprägungen weitestmöglich zu erweitern. Hierbei sind die engen Vernetzungsbeziehungen mit anderen Mager- und Feuchtgrünlandtypen zur Ausbildung eines kleinteiligen Gesamtlebensraummosaiks von besonderer Bedeutung.<br>Die ehemals (…) landschaftsbestimmenden Zwergstrauchheiden sind heute meist in isolierten Restflächen erhalten. Für Zwergstrauchheiden sind zwei Kriterien zur Festlegung der Minimalfläche gleichzeitig zu berücksichtigen: die Flächengröße des Einzelbiotopes von minimal 4 ha und die Notwendigkeit der Bildung von Komplexen aus mehreren Zwergstrauchheiden mit Borstgrasrasen und anderen trockenwarmen Biotopen (Felsen, Trockenrasen, Halbtrockenrasen, Magerwiesen, Waldsäumen, Hecken) (AW: bzw. in der Hocheifel mit Moorheiden, Zwischenmooren, und Magerwiesen und –weiden) von minimal 25 ha Gesamtgröße, (AW: damit alle regionaltypischen Tierarten vorkommen können). Die Flächen sollten durch lineare Strukturelemente (Wegränder, Bahndämme, Waldschneisen) miteinander verbunden werden. (AW: Anzustreben sind Erweiterungen von Zwergstrauchheiden im Umfeld bestehender Ausprägungen v.a. in der Ost-, der Vulkan- und der Südlichen Ahreifel.)"<br>(VBS 1993 NR, S. 85 & VBS 1994 AW, S. 111) | | Im Bereich noch vorhandener Restbestände von Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden soll vorhandenes Standortpotenzial genutzt werden, um möglichst große, bezüglich der Zwergstrauchheiden mindestens 4 ha große Einzelbiotope gemäß der Zielgrößen der Planung zu erreichen.<br>Im Umfeld der äußerst seltenen Bestandsflächen konnten kaum Potenzialflächen zur Erweiterung genutzt werden. Auch im Bereich konzentrierter Leitartennachweise konnten nur wenige Entwicklungsflächen mit Potenzial gefunden werden.<br><br>Wie bei den Trockenrasen wird hier verstärkt die Bildung von Mosaikkomplexen magerer, offenlandbestimmter Biotope angestrebt. |

| Zielgröße nach VBS[3] | Änderung gegenüber VBS 1993/94 | Umsetzung in Zielekarte |
|---|---|---|
| Pioniervegetation | | |
| "Abgrabungsflächen mit Rohbodenstandorten sollten zur Entwicklung einer Artenschutzfunktion mindestens 1 ha groß sein. Je größer eine Abgrabungsfläche ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das vielfältige Mosaik unterschiedlicher Kleinstrukturen ausbilden kann." (VBS 1993 NR, S. 120)<br>"Eine generell gültige untere Flächengröße für Abgrabungen ist nicht ableitbar. Das notwendige vielfältige Mosaik unterschiedlicher Kleinstrukturen für die biotoptypischen Wirbellosen bildet sich in erster Linie in Abhängigkeit von der Abgrabungstechnik (Maschineneinsatz, Zahl und Dauer der Abgrabungsabschnitte) aus. In Schwerpunkträumen des Vorkommens der o.g. Vogelarten sind größere Flächen (Steinschmätzer: 2 ha) anzustreben.<br>Kleinstrukturen, die Trittstein- und Refugialfunktionen für die typische Tierwelt in der Agrarlandschaft wahrnehmen sollen, müssen als flächenhaft ausgebildete Lebensrauminseln mindestens 0,2 ha groß sein. Lineare Rainstrukturen müssen so breit sein, dass Immissionen aus der landwirtschaftlichen Nutzung (z.B. Dünger, Pestizide) den Lebensraumkern nicht treffen (je nach Lage, Exposition und Umfeld drei bis über zehn Meter, vgl. LÜTTMANN et al. 1991) und dürfen nicht weiter als 100 -150 m über Äcker voneinander entfernt liegen." (VBS 1994 AW, S. 155) | | Flächen der Pioniervegetation sind Kleinstrukturen, die in enger Verzahnung mit anderen Biotoptypen vorkommen. Eine eigenständige Umsetzung der Ziele erfolgt nicht. " |

| Zielgröße nach VBS[3] | Änderung gegenüber VBS 1993/94 | Umsetzung in Zielekarte |
|---|---|---|
| Strauchbestände | | |
| "Aufgrund der Flächenansprüche typischer Arten sollte der Biotoptyp "Strauchbestände" in seiner flächenhaften Ausprägung eine Fläche von 0,5 ha nicht unterschreiten. Die Mindestdichte und Verteilung von linienhaften Gehölzstrukturen in den Acker- und Grünlandbereichen lassen sich nicht generell festlegen, da sie sich auch an der Nutzungsart und -intensität und am Charakter der jeweiligen Landschaft orientieren müssen. Ausgehend von den Funktionen als Lebensraum für Tiere lassen sich jedoch folgende Richtwerte ableiten:<br>In strukturreichen, mit Gehölzen durchsetzten Landschaften sollte die Heckenlänge in Flächenausschnitten von 100 ha wenigstens 8.000 m betragen (Mindestbreite 3 - 5 m); d.h. der Flächenanteil linienhafter Strauchstrukturen beträgt einschließlich der Saumbereiche mindestens 3 - 4%.<br>In gehölzarmen Landschaften sollte der Flächenanteil aller Extensivstrukturen (Grassäume, krautige Brachen, aber auch Gehölzstreifen) 3% nicht unterschreiten. In ackerbaulich genutzten Bereichen sollten dabei Hecken und Strauchbestände bevorzugt in Komplexe mit regelmäßig eingestreuten (extensiv genutzten) Grünlandbeständen von mehr als 1 ha Größe entwickelt werden (Abstand unter 500 m)." (VBS 1993 NR, S. 111 & VBS 1994 AW, S. 144) | | Strauchbestände sind Kleinstrukturen, die in enger Verzahnung mit anderen Biotoptypen vorkommen. Eine eigenständige Umsetzung der Ziele erfolgt nicht. |
| Ackerflächen, Rebfluren, Obstplantagen | | |
| Zielgrößen für Ackerflächen, Rebfluren und Obstplantagen werden nur in den Textbänden der intensiv landwirtschaftlich genutzen Kreise im Süden des Landes vorgegeben. | | Nach Abschluss der leitartenbezogenen Zielzuweisungen werden die kleinflächigen Strukturen der Strauchbestände, der Pioniervegetation und der Wiesen und Weiden, die innerhalb großflächiger Agrarräume liegen, den Ackerbiotopen zugewiesen.<br>Eine Zuweisung von Zielen für solche Kleinststrukturen erscheint nicht sinnvoll, stattdessen werden bei entsprechenden Leitartenvorkommen die Signaturen "Extensivierung intensiv genutzter Flächen, Erhöhung des Grünlandanteils“ und "Entwicklung von Biotopstrukturen im Agrarraum" eingesetzt. |

## 4.3 Ergänzende Schritte der Zielableitung

### 4.3.1 Entwicklungsbereiche im Offenland – Komplexbiotope

Die VBS-Bearbeitung 1993/94 stellte größere Entwicklungsbereiche im Offenland und stellenweise auch im Übergang vom Offenland zum Wald als Komplexbiotope dar.

Nach Abschluss der regelbasierten und leitartenorientierten Zielableitung verbleiben einige dieser Bereiche ohne Entwicklungssignaturen, da aus den aktuellen Bestandsdaten (Biotope und Arten) kein unmittelbarer Entwicklungsbedarf abzuleiten ist. Da diesen Flächen bei der Erstbearbeitung 1993/94 ein hoher naturschutzfachlicher Wert zugeschrieben wurde und dieser zumindest bereichsweise weiterhin begründet erscheint, erfolgt im Anschluss an die leitartenbezogene Zielableitung eine genauere Betrachtung der damaligen Komplexbiotope. Sofern die Ziele auch heute sinnvoll erscheinen und dem Potenzial der HpnV entsprechen, werden sie übernommen. Flächen die in der VBS 1993/94 als Komplexbiotope aus Mageren Wiesen und Acker dargestellt wurden, werden in den aktuellen Karten mit den Signaturen der Schwerpunkträume im Agrarraum gekennzeichnet.

### 4.3.2 Besonderheiten der Landkreise Neuwied und Ahrweiler

**Wacholderheiden der Osteifel“**

Jahrhunderte beweideten Nutztiere die mageren Wiesen und Heiden der Osteifel. Sie haben das Landschaftsbild entscheidend geprägt. Zielsetzung des Naturschutzes ist es, diese Elemente als Bestandteile der Kulturlandschaft und des regionalen Biotopnetzes zu bewahren. Das Natura 2000 Gebiet „Wacholderheiden der Osteifel“ im Landkreis Ahrweiler (sowie übergreifend im Landkreis Mayen-Koblenz, siehe die Flächendarstellungen dort) besteht aus zahlreichen isoliert gelegenen Gebietsbestandteilen die jeweils Reste der Wacholder- und Besenginster-Heidekraut-Heiden enthalten. Weite Teilbereiche weisen einen anderen Biotopcharakter auf und sind meist von naturfernen Fichtenbeständen eingenommen. Da eine Vernetzung der Gebietsbestandteile auch aufgrund der teils großen Entfernungen voneinander bislang nicht umsetzbar erschien, konzentrierten sich die Zielsetzungen des Naturschutzes auf den Erhalt der Restbestände. Um dies zu unterstützen wurden in der VBS Entwicklungsflächen gesucht, die einen Kontakt der tlw. innerhalb geschlossener Waldbestände liegenden Heideflächen zum nächstgelegenen Offenland ermöglicht. Diese Bereiche sind in der VBS als Kernflächen für den Erhalt bzw. mehrheitlich die Entwicklung von Heiden dargestellt. Darüber hinaus ist aber für eine Revitalisierung ein Biotopverbund durch Integration in eine Beweidung (Wanderschäferei) erforderlich (vgl. http://www.wacholderheiden.eu). Soweit in den betreffenden Bereichen als Folgen des Klimawandels aktuell große Freiflächen durch Zusammenbruch v.a. der Fichtenbestände entstehen, sollten Optionen geprüft werden, in wieweit der ablaufende strukturelle Wandel für die Schaffung eines Biotopverbundes zwischen den Kernflächen genutzt werden kann. Bereiche in denen nach heutiger Datenlage bevorzugt Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, wurden im Rahmen der VBS dargestellt.

### 4.3.3 Integration externer Fachkonzepte

Bei der Aktualisierung der VBS sollen bestehende Fachkonzepte des Naturschutzes beachtet werden, soweit sie vergleichbare Datengrundlagen verwenden und vergleichbare Ziele verfolgen und aufgrund ihres Planungsmaßstabs integrierbar sind.

Neben vorhandenen Fachkonzepten der Landesnaturschutzbehörden, zu denen in erster Linie das Konzept der „Wildtierkorridore“ zählt, wurden diesbezüglich für die Landkreise die folgenden externen Fach-Konzepte ermittelt, deren Integration im Rahmen der Aktualisierung der VBS-Zielekarten sinnvoll / erforderlich erschien.

**Tabelle 4: Liste ausgewerteter externer Fach-Konzepte**

| Projekt | Quelle | Berücksichtigung / Anpassungen |
|---|---|---|
| BAT-Konzept | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten (2011): Konzept zum Umgang mit Biotopbäumen, Altbäumen und Totholz bei Landesforsten Rheinland-Pfalz | Aufgrund ihrer Kleinteiligkeit werden nur Waldrefugien größer als 2 ha berücksichtigt. Diese werden mit Entwicklungssignatur belegt, sofern weitere Entwicklungsflächen angrenzen. |
| Biotopbetreuung, MAS-Flächen | Datensatz Lieferung LfU 30.08.2019 | Abgleich der Maßnahmen (insbesondere Beweidungsflächen) mit den VBS-Zielen |
| Potenzialflächen Bechsteinfledermaus | Potenzialflächenanalyse im Wald / Modellierung LfU und MUEEF (Stand 07.08.2017) | Im Bereich der Potenzialflächen Bechsteinfledermaus wurden (Laub-) Waldentwicklungsflächen vorgesehen. Im Bereich größerer funktionaler Einheiten wurde die Aufsignatur „Entwicklung großflächiger Waldbiotope mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz“ angewendet. |
| Haselhuhn Potenzialflächen | Entwurf Zielflächenkulisse für Maßnahmen zum Schutz des Haselhuhns. LfU 2017 | Als Entwicklungspotenzial trotz derzeit fehlender Nachweise berücksichtigt. Insbesondere ertragsschwache Wälder wurden als Entwicklungsflächen vorgesehen, das Potenzial für Trockenwälder wurde ausgeschöpft. |
| Aktion Blau Plus | MUEEF (Lieferung der Daten durch LfU am 21.08.2019) | Übernahme von (geplanten) Maßnahmen (-schwerpunkten) zur Auenentwicklung / Habitatverbesserung (soweit nicht ohnehin nach den VBS-Kriterien erfasst) |
| Naturpark Rhein-Westerwald | Zonierung des Naturparks aus LANIS (Download am 01.08.2016) | Die Kernzonen des Naturparks dienen laut Landesverordnung von 1978 hauptsächlich der Erholung in der Stille. Für die VBS auswertbare Inhalte / Schwerpunktsetzungen resultieren aus der Naturpark-Zonierung nicht. |
| EU Life Projekt Wacholderheiden der Osteifel | Verbandsgemeinde Vordereifel http://www.wacholderheiden.eu/index.php?id=105 | Abgleich der Projektflächen mit den Zielen der VBS |

| Projekt | Quelle | Berücksichtigung / Anpassungen |
|---|---|---|
| Bewirtschaftungs-pläne Natura 2000 | SGD Nord (Datenlieferung durch LfU am 17.09.2019) | Berücksichtigung der Maßnahmenpläne der FFH-Gebiete:<br>FFH 5608-303 „Wacholderheiden der Osteifel“<br>FFH 5510-302 „Rheinhänge zwischen Unkel und Neuwied“<br>FFH 5410-302 „Felsentäler der Wied“<br>FFH 5410-301 „Wälder zwischen Linz und Neuwied“<br>FFH 5408-302 „Ahrtal“<br>FFH 5610-301 „Nettetal“<br>FFH 551-302 „Brexbach- und Saynbachtal“<br>FFH 5510-301 „Mittelrhein“<br>FFH 5509-302 „Vulkankuppen am Brohlbachtal“<br>FFH 5507-301 „Wälder am Hohn“<br>FFH 5506-302 „Aremberg“<br>FFH 5409-301 „Mündungsgebiet der Ahr“<br>FFH 5310-303 „Heiden und Wiesen bei Buchholz“<br>FFH 5309-305 „Asberg bei Kalenborn“<br><br>Und der VS-Gebiete:<br>VSG 5511-401 „Engerser Feld“ und VSG 5511-301 „NSG Urmitzer Werth“ |
| Übersicht von TK25-Quadranten mit besonderer Bedeutung für den Schwarzstorch | Unveröffentlichte externe Datensammlung (Datenlieferung durch LfU am 21.09.2017) | Im Bereich der TK25-Quadranten mit besonderer Bedeutung für den Schwarzstorch wurde die Vernetzung von Nass- und Feuchtwiesen (Nahrungshabitate des Schwarzstorchs, die raumbezogen limitierend sind) durch Schaffung von Entwicklungsflächen betont. |
| Naturschutzgroß-projekt Obere Ahr Hocheifel | Gewässerrandstreifenprojekt Obere Ahr-Hocheifel. Pflege- und Entwicklungsplan (Stand Juli 2011) | Integration der Biotopkartierung innerhalb des Projektgebietes in die Erstellung des Bestanddatensatzes, Abgleich der Maßnahmenplanung mit den VBS Zielen |
| Durchführbarkeits-studie zur Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen für Gelbbauchunke und Kammmolch (FFH Anhang II) | Bericht im Auftrag der SGD Nord (2016-2017) (Datenlieferung durch LfU am 31.10.2019) | Berücksichtigung der Vorkommensdaten |
| Habitatmaßnahmen für die Gelbbauchunke – Projektregion Nördliches Rheinland/RLP | Bundesprogramms Biologische Vielfalt (NABU Niedersachsen) | Berücksichtigung der Projektinhalte bei der Zielableitung. |

### 4.3.4 Integration der Wildtierkorridore

Das Konzept der Wildtierkorridore (LUWG 2008) wurde in Abgleich mit den eigenen Grundlagendaten bei der Ableitung der Zielekarte berücksichtigt und in die Karten eingearbeitet.

## 4.4 Abschließende GIS-technische Bearbeitungsschritte zur Erstellung der Zielekarte

Nach der Zuweisung der Planungsziele, basierend auf den Ansprüchen der Leitarten, wurde der Datensatz abschließend GIS-technisch unter Berücksichtigung der Vorgaben der Arbeitshilfe (FÖA 2015) behandelt:

- Bereinigung von kleinflächigen Biotopstrukturen im Siedlungsbereich und Agrarraum
- Allgemeine Reduktion von Kleinstflächen
- Reduktion von Kleinstflächen mit Entwicklungssignatur angrenzend an Erhaltsflächen gleichen Biotoptyps
- Zusammenfassung nach Biotoptyp, Ziel und ggf. Zusatzinformation unter Beibehaltung der Quellinformationen.

## 4.5 Ergebnis Zielekarte

Die aktualisierten Zielekarten wurden im Maßstab 1:25.000 als pdf-Dateien mit Ebenensteuerung ausgegeben. Die Aufteilung der Blattschnitte entspricht der Darstellung in der VBS NR (1993) und der VBS AW (1994).

Der Auftraggeber erhält zudem die zugehörigen Projektdateien (.mxd) und alle relevanten Datensätze als shapefile.

# 5 Quellenverzeichnis

Burkhardt, R.; Jaeger, U.; Mirbach, E.; Rothenburger, A.; Schwab, G.(1995): Planung vernetzter Biotopsysteme. Design of the habitat network of Rheinland-Pfalz State Germany. Ecological networks. Landscape 95/3, special issue. ECNC Publication Series on Man and Nature, 99-110.

Burkhardt, R.; Baier, H.; Bendzko, U.; Bierhals, E.; Finck, P.; Liegel, A.; Mast, R.; Mirbach, E.; Nagler, A.; Pardey, A.; Riecken, U.; Sachteleben, J.; Schneider, A.; Szekely, St.; Ullrich, K.; Hengel, U. van; Zeltner, U.; Zimmermann, F. (2004): Empfehlungen zur Umsetzung des § 3 BNatSchG "Biotopverbund". Ergebnisse des Arbeitskreises "Länderübergreifender Biotopverbund" der Länderfachbehörden mit dem BfN. Naturschutz und Biologische Vielfalt 2. 84 pp.

Bushart, M. (1989): Erläuterungen zur Kartierung der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation (hpnV) Rheinland-Pfalz; 1:10000 in den Bereichen Mittelrhein, untere Mosel, Neuwieder Becken mit Laacher-See-Gebiet, Nahetal und Rheinisches Hügelland, Oberwesterwald und Westlicher Hunsrück. Im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz. Oppenheim.

De Vries, H. H.; den Boer, P. J.; Van Dijk, Th. S. (1996): Ground beetle species in heathland fragments in relation to survival, dispersal, and habitat preference. Oecologia 107, 332-342.

FÖA (2015): Arbeitshilfe zur Aktualisierung der Zielekarten der Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS) in Rheinland-Pfalz. I.A. des Landesamtes für Umwelt (LfU). https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Arbeitshilfe_VBS.pdf.

LUWG (2008): Wildtierkorridore in Rheinland-Pfalz. Abschlussbericht 2007. Arbeitskreis Wildtierkorridore Rheinland-Pfalz auf der Grundlage eines Gutachten von ÖKOLOG (M. Herrmann). Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz. 37pp. (als Mskr. veröff.). Kurzbeschreibung: https://lfu.rlp.de/de/naturschutz/arten-und-biotopschutz/anthropogene-wirkungen/ (20.03.2017).

LUWG /(Bearb.) (2009): Natürliche Vegetationsgebiete in Rheinland-Pfalz. Heutige potentielle natürliche Vegetation (HpnV). Erfassung 1990 - 2003. Digitaler Datenbestand 2009 mit Legende. Hrsg. Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten, Rheinland-Pfalz - Abt. Forsten, Mainz. Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht (LUWG).https://lfu.rlp.de/de/naturschutz/daten-zur-natur-planungsgrundlagen/

Wahl, P. (1990): Arbeitshilfe für die Auswertung der Kartierung der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation. Zuordnung der Ersatzgesellschaften und Biotoptypen der VBS zu den Kartiereinheiten (unter Verwendung von Bushart, 1989). Unveröff. Mskr. (P. Wahl, Bearb.). Landesamt für Umweltschutz. Oppenheim.